

its

Infecciones del Torrente Sanguíneo



Las ITS aumentan considerablemente los costos hospitalarios y la duración de la estancia.



La tasa de mortalidad atribuible estimada por ITS se encuentra entre 12-25%.

EL 11%

de las infecciones asociadas a la atención médica se las atribuyen a infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con el catéter

PSA+

**Hospitaliza-
ción antes
prolongada de
la cateteriza-
ción.**

1.

**2. Duración
prolongada del
cateterismo.**

**3. Duración
prolongada del
cateterismo.**

**4. Colonización micro-
biana abundante en
el sitio de inserción
y/o conector del ca-
téter.**

**5. Cateterización
femoral en
adultos.**

6. Neutropenia

**7. Disminución
de la proporción
enfermera/
paciente en la UCI**

its

**Los factores de riesgo
independientes para ITS
asociados con la línea
central incluyen:**

PSA+

CUESTIONES CLAVE ITS

La ITS a menudo es iatrogénica debido a procedimientos o dispositivos invasivos, como la colocación de un catéter venoso central.



CATÉTERES VASCULARES

La ITS relacionada con catéteres vasculares es la causa más común de bacteriemia asociada a la atención médica.



La prevención de la ITS relacionada con el catéter **es una iniciativa de alta prioridad** para la prevención de infecciones.



PSA+